de la suture. La taille est grande et égale celle des plus grands exemplaires de *C. antatsima* s. str.

Le dessin des élytres rappelle celui de *C. candida* Dej., de l'Afrique australe. J'ai donné à cette race le nom de **fotsy**, n. var., qui signifie « blanc » en malgache.

Types : six exemplaires bien identiques communiqués par M. Donckier de Donceel et provenant tous des rives du Manampatra, fleuve qui se jette dans l'Océan Indien à Farafangana, sur la côte sud-orientale de Madagascar.

J'ai découvert le type de l'espèce sur les bords du Mandraré, qui coule bien plus au Sud de la grande île.

Description de deux Cétonides nouveaux d'Afrique orientale

[Col. Scarabaeidae]

par A. Bourgoin.

Apocnosis Jeanneli, n. sp. — *Supra viridi-olivacea, nitida, ochraceo variegata. Fronte laevi, clypeo ad latera sat grosse punctato, antice subcirculariter emarginato; prothorace glabro, sparse punctato; scuto medio laevi; elytris bicostatis, vage striatis, irregulariter punctatis, minutissime erecte pilosis; pygidio leviter punctato, apice flavo piloso. Subtus olivaceo-viridis, nitida; processu mesosterni ante apicem flavo ciliato; tibiis posticis in medio extus unidentatis.*

Bien que ne présentant pas tous les caractères du genre, cette espèce est assez voisine d'*A. striata* Janson pour pouvoir en être rapprochée. La forme générale de la tête et celle du corps sont les mêmes ; seulement la saillie mésosternale est moins avancée que celle d'*A. striata*, la suture en est plus visible, garnie de longs poils flaves et la partie mésosternale forme un rebord bien net en avant du métasternum.

Le front est lisse, avec, près des yeux, quelques points plus nombreux chez la ♀ que chez le ♂ ; le clypéus est lisse au milieu, ponctué et déprimé de chaque côté et en avant, pourvu d'un rebord tranchant assez élevé même au devant de l'échancrure antérieure. Le pronotum est un peu moins avancé sur le scutellum que chez *A. striata*, ponctué assez éparsement sur le disque, surtout chez le ♂, à points plus rap-

prochés sur les côtés, plus gros vers les angles antérieurs. Le scutellum plus grand que celui d'*A. striata*, est lisse au milieu, ponctué sur les côtés.

Les élytres ont chacun deux côtes qui aboutissent à un calus antéapical saillant. Ils présentent chacun neuf stries mal tracées, les externes surtout peu visibles et très abrégées; toute la surface est couverte de poils extrêmement courts et d'une ponctuation irrégulière assez fine, très serrée et presque rugueuse dans les sillons qui existent entre les côtes. Le pygidium porte des points irréguliers, épars, plus gros et plus rapprochés chez la ♀, et des poils d'un blanc jaunâtre, plus longs et plus serrés vers le sommet. La base présente de chaque côté une légère dépression transversale.

Le dessous est vert olivâtre très brillant, presque entièrement concolore. Les hanches antérieures, la suture méso-métasternale, les fémurs en dedans, portent des poils flaves; les pattes, les bords latéraux de l'abdomen, sont variés de flave. Les tibias postérieurs ont une dent vers le milieu de leur tranche externe.

Longueur du bord antérieur du pronotum à l'extrémité des élytres : 18,5 mill. Largeur aux épaules : 10 mill.

Afrique orientale anglaise : mont Kénya, versant ouest, zone des forêts, 2.400 m.; janvier-février 1912. — Mission Alluaud et Jeannel

Types. Coll. du Muséum de Paris et coll. A. Bourgoin.

Porphyronota Alluaudi, n. sp. — *Nigra, nitida, supra flavo-variegata. Capite rugoso punctato, clypeo antice angustato, margine antico elevato, emarginato, utrinque dentato; prothorace grosse et dense punctato, punctis subovatis, pupillatis; scutello antice rugoso punctato, ad latera unistriato; elytris disco profunde striatis; lateribus punctato-striatis; pygidio antice sat fortiter et dense, apice leviter transversim striolato. Subtus fulvo pilosa; metasterno grosse punctato, apice mesosterni subtriangulari; femoribus, tibiis tarsisque intus fulvo-villosis.*

Très brillant, tout noir en dessous; dessus noir, varié de taches flaves irrégulières, très petites chez certains individus, pouvant envahir presque toute la surface chez d'autres. La tête est densément et presque rugueusement ponctuée, avec le sommet du front lisse au milieu; le clypéus, légèrement rétréci antérieurement, est relevé en avant et le rebord est échancré au milieu, de sorte que chacun des angles antérieurs se relève en une petite dent aiguë.

Le pronotum, un peu plus large que long, est en forme d'octogone irrégulier, uniformément couvert de points assez gros, peu réguliers,

subovales, pupillés. Le scutellum est rugueusement ponctué à la base avec, de chaque côté, une forte strie qui n'atteint pas le sommet. Les trois premières stries des élytres sont profondément gravées et ponctuées de signes arqués allongés, confluents, qui leur donnent l'aspect géminé; les autres stries sont de moins en moins marquées à mesure qu'elles se rapprochent du bord externe; sur la déclivité latérale se trouvent deux rangées de gros points qui commencent un peu en arrière de la saillie humérale. Le pygidium est densément et nettement striolé transversalement à la base, plus finement vers le sommet qui porte quelques soies rousses très courtes.

Le métasternum est grossement ponctué, plus densément vers les côtés et sillonné en son milieu. La suture méso-métasternale est nettement visible, et le mésosternum forme une pointe triangulaire à angle antérieur un peu obtus. Les hanches antérieures en avant, les fémurs, les tibias et les tarses en dedans sont garnis de poils fauves.

Longueur du bord antérieur du thorax à l'extrémité des élytres : 12 mill. Largeur aux épaules 7,5 mill.

Afrique orientale anglaise : monts Aberdare, versant sud-ouest, lisière inférieure des forêts et prairies découvertes, 2.600-2.700 m.; février 1912. — Mission Alluaud et Jeannel.

Types. Coll. du Muséum de Paris et coll. A. Bourgoin.

Description d'un *Althaesia* [Col. Diphyllini] appartenant au British Museum

par A. Grouvelle.

Althaesia Arrowi, n. sp. — *Oblonga, convexa, nitida, atra, pilis in capite prothoraceque flavis, in elytris flavo-cinereis restitu; pedibus fusco-rufis. Antennae subelongatae et subincrassatae, pubescentes; 3° articulo sesquilongiore quam latiore; clava abrupta, solum intus dilatata, apicem versus paulatim vix latiore, et duplo longiore quam latiore. Caput transversum, convexiusculum, subdense punctatum, utrinque inter oculum et antennae basin elevatum, dense flavo-pubescens; margine antico subtruncato, ante antennarum bases parum producto; labro magno; oculis prominulis, valde granosis Prothorax*